

第8回枝肉成績(ゼオライト0.5%添加試験) A1~4、B1は16年12月7日出荷 12月

区分	名号	牛略号	終了時月齢	終了時体重	屠殺前体重	冷枝肉重量	枝肉歩留%	格付け	ロース芯面積
無添加区	松系福	A1	29.9	680	665	429.6	64.6	B4	46
	奈津太郎	A3	29.2	778	761	489.6	64.3	A4	50
	恭二	B2	30.5	724	709	472.5	66.6	A4	48
	石鎚44	B5	29.2	726	706	454.2	64.3	A4	49
平均			29.7	727.0	710.3	461.5	65.0		48.3



区分	名号	牛略号	終了時月齢	終了時体重	屠殺前体重	冷枝肉重量	枝肉歩留%	格付け	ロース芯面積
サンビオネオ 粉末添加区	幸太郎3	A2	29.2	730	712	453.1	63.6	A5	61
	栄	A4	28.7	736	717	469.4	65.5	A4	58
	小道	B3	30.3	776	755	494.8	65.5	A5	65
	石鎚43	B4	29.2	718	696	454.3	65.3	A5	52
平均			29.4	740.0	720.0	467.9	65.0		59.0



区分	名号	牛略号	終了時月齢	終了時体重	屠殺前体重	冷枝肉重量	枝肉歩留%	格付け	ロース芯面積
無添加区	徳男	B1	27.6	642	638	413.3	64.8	A4	48

B1は出荷前2ヶ月間増体なしであったため、早期出荷とした。(試験から除外)

* 石鎚44(対照区)と石鎚43(試験区)
は、双子です。

9日格付け、B2～B5は17年4月12日出荷 4月14日格付け

バラ厚cm	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo	交雑等級	BCSNo	光沢	等級	締まり	きめ	等級	BFSNo	光沢と質	等級	か庇
6.4	3.0	71.6	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	シロリ(ロース)
7.9	3.4	72.0	6	4	3	4	4	4	5	4	3	5	5	なし
10.0	3.2	73.5	7	4	4	5	5	5	5	5	3	5	5	なし
8.0	3.2	72.6	6	4	4	4	4	4	5	4	3	5	5	なし
8.1	3.2	72.4	6.0	4.0	3.8	4.3	4.3	4.3	4.8	4.3	3.0	5.0	5.0	#DIV/0!



バラ厚cm	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo	交雑等級	BCSNo	光沢	等級	締まり	きめ	等級	BFSNo	光沢と質	等級	か庇
8.8	3.3	74.6	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	なし
7.3	3.5	72.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	なし
8.0	3.2	74.1	9	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	なし
7.6	3.5	72.4	8	5	4	5	5	5	5	5	3	5	5	なし
7.9	3.4	73.5	7.8	4.8	4.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	3.0	5.0	5.0	#DIV/0!



バラ厚cm	皮下脂肪厚	歩留基準値	BMSNo	交雑等級	BCSNo	光沢	等級	締まり	きめ	等級	BFSNo	光沢と質	等級	か庇
6.6	2.3	72.8	5	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	なし

単価	枝肉金額	4月出荷に合わせた		備考
1,800	773,280	1850	794760	ビタミンC添加
2,050	1,003,680	2100	1028160	ビタミンC添加
2,100	992,250	2,100	992250	対照区
2,100	953,820	2,100	953820	対照区
2012.5	930757.5	2037.5	942247.5	



単価	枝肉金額	4月出荷に合わせた		備考
2,300	1,042,130	2350	1064785	ビタミンC添加
1,980	929,412	2030	952882	ビタミンC添加
2,350	1,162,780	2,350	1162780	対照区
2,250	1,022,175	2,250	1022175	対照区
2220.0	1039124.3	2245.0	#####	



単価	枝肉金額	4月出荷に合わせた	
1,940	801,802	1990	822467